

## Внутримышечное введение лекарственного препарата

№ п/п	Перечень практических действий
1.	Установить контакт с пациентом (поздороваться, представиться, обозначить свою роль)
2.	Идентифицировать пациента (попросить пациента представиться)
3.	Сверить ФИО пациента с медицинской документацией
4.	Объяснить ход и цель процедуры (уточнить аллергологический анамнез)
5.	Убедиться в наличии у пациента добровольного информированного согласия на предстоящую процедуру
	<b>Подготовка к процедуре</b>
6.	Предложить пациенту занять удобное положение на кушетке лежа на животе
7.	Проверить герметичность упаковки и срок годности одноразового шприца и иглы
8.	Проверить герметичность упаковки и срок годности иглы для инъекции
9.	Проверить герметичность упаковки и срок годности одноразовых спиртовых салфеток
10.	Взять упаковку с лекарственным препаратом, сверить его наименование с назначением врача, проверить дозировку, объем и срок годности
11.	Выложить на манипуляционный стол расходные материалы и инструменты
	<b>Выполнение процедуры</b>
12.	Надеть средства защиты (маску одноразовую)
13.	Обработать руки гигиеническим способом
14.	Надеть нестерильные перчатки
15.	Вскрыть поочередно 4 одноразовые спиртовые салфетками и не вынимая из упаковки оставить на манипуляционном столе
16.	Взять ампулу с лекарственным средством в доминантную руку, чтобы специально нанесенный цветной маркер был обращен к аккредитуемому
17.	Достать ампулу из упаковки. Прочитать на ампуле название препарата, объем и дозировку
18.	Встряхнуть ампулу, чтобы весь лекарственный препарат оказался в ее широкой части
19.	Обработать шейку ампулы первой стерильной спиртовой салфеткой
20.	Обернуть этой же спиртовой салфеткой головку ампулы
21.	Вскрыть ампулу резким движением пальцев руки «от себя»
22.	Вскрытую ампулу с лекарственным средством поставить на манипуляционный стол
23.	Спиртовую салфетку (внутри которой головка ампулы) и упаковку от нее поместить в емкость для медицинских отходов класса «А»
24.	Вскрыть упаковку одноразового стерильного шприца со стороны поршня
25.	Взяться за рукоятку поршня и обеспечить соединение цилиндра шприца с иглой внутри упаковки (не снимая колпачка с иглы)
26.	Взять собранный шприц из упаковки, снять колпачок с иглы, придерживая иглу за канюлю
27.	Поместить колпачок из-под иглы в емкость для медицинских отходов класса «А»
28.	Ввести иглу в ампулу, стоящую на столе и набрать нужное количество препарата, избегая попадания воздуха в цилиндр шприца
29.	Поместить пустую ампулу в емкость для медицинских отходов класса «А»
30.	Снять двумя пальцами одной руки иглу с цилиндра шприца
31.	Поместить иглу в непрокальваемый контейнер отходов класса «Б»
32.	Выложить шприц без иглы на стерильную поверхность упаковки от шприца
33.	Вскрыть стерильную упаковку иглы для инъекции со стороны канюли и взяв шприц, присоединить шприц к канюле иглы

34.	Поместить упаковку от иглы в емкость для медицинских отходов класса «А»
35.	Вытеснить воздух из шприца в колпачок до появления первой капли из иглы
36.	Положить собранный шприц с лекарственным препаратом в упаковку
37.	Попросить пациента освободить от одежды ягодичную область для инъекции (верхний наружный квадрант ягодицы)
38.	Осмотреть и пропальпировать предполагаемое место инъекции
39.	Обработать двукратно место инъекции 2 и 3 спиртовыми салфетками
40.	Использованные спиртовые салфетки и упаковки от них поместить в емкость для медицинских отходов класса «Б»

41.	Туго натянуть кожу пациента в месте инъекции большим и указательным пальцами одной руки, а в доминантную руку взять шприц, придерживая канюлю иглы
42.	Ввести иглу быстрым движением руки под углом 90° на 2/3 её длины
43.	Потянуть поршень на себя и убедиться в отсутствии крови в канюле иглы
44.	Медленно ввести лекарственный препарат в мышцу не доминантной рукой
45.	Извлечь иглу, прижав к месту инъекции 4-ю спиртовую салфетку, не отрывая руки с салфеткой, слегка помассировать место введения лекарственного препарата
	<b>Завершение процедуры</b>
46.	Отсоединить иглу от шприца с помощью иглосъемника и поместить в непрокальваемый контейнер отходов класса «Б»
47.	Шприц в неразобранном виде поместить в емкость для медицинских отходов класса «Б»
48.	Убедиться в отсутствии наружного кровотечения в области инъекции
49.	Поместить спиртовую салфетку, использованную при инъекции в емкость для медицинских отходов класса «Б»
50.	Упаковку от шприца и упаковку от салфетки поместить в емкость для медицинских отходов класса «А»
51.	Обработать рабочую поверхность манипуляционного стола дезинфицирующими салфетками двукратно с интервалом 15 минут методом протирания
52.	Салфетки поместить в емкость для медицинских отходов класса «Б»
53.	Снять перчатки
54.	Поместить перчатки в емкость для отходов класса «Б»
55.	Снять медицинскую одноразовую маску
56.	Поместить маску в емкость для отходов класса «Б»
57.	Обработать руки гигиеническим способом
58.	Уточнить у пациента о его самочувствии
59.	Сделать запись о результатах выполнения процедуры в медицинской документации